

Diclostim roztwór do płukania gardła 0,74 mg/ml 250 ml



Nasza cena: 23,76 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,74 MG/ML
Opakowanie	250 ml
Postać	ROZT.D/PLUK.GARDLA
Producent	Solinea
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Lek DICLOSTIM stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, np.:

- zapalenie dziąseł,
- zapalenie jamy ustnej,
- zapalenie gardła,
- stany zapalne po zabiegach stomatologicznych,
- mechaniczne podrażnienia jamy ustnej.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), nie należy stosować produktu leczniczego Diclostim u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn, może być przyczyną napadu astmy, pokrzywki lub alergicznego nieżytu nosa.

Produktu leczniczego Diclostim jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie mogą przyjmować tego produktu leczniczego.

Składniki:

Każdy ml roztworu do płukania gardła / jamy ustnej zawiera 0,74 mg diklofenaku (Diclofenacum) w postaci diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sól, etanol, glikol propylenowy (E 1520), sodu benzoesan (E 211), sorbitol (E 420), czerwień koszenilowa (E 124).

Produkt leczniczy Diclostim zawiera:

- 58 mg sodu w każdej pojedynczej dawce (15 ml),
- mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od potasu”,
- 8,7 mg etanolu w każdej pojedynczej dawce (15 ml),
- 312 mg sodu benzoesanu w każdej pojedynczej dawce (15 ml),
- 75 mg glikolu propylenowego w każdej pojedynczej dawce (15 ml),
- 375 mg sorbitolu w każdej pojedynczej dawce (15 ml),
- 0,78 mg czerwieni koszenilowej (E 124) w każdej dawce (15 ml).

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować po tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Ulotka informacyjna dla pacjenta

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.