

Diclotica, żel 0,01 g/g, 100g



Nasza cena: 17,82 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,01 G/G
Opakowanie	100 g
Postać	ZEL
Producent	TACTICA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM

Opis produktu

OPIS

DICLOTICA to lek w postaci żelu zawierającego diklofenak o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Produkt Diclotica jest przeznaczony **dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.**

SKŁAD

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jeden gram żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, hydroksyetyloceluloza, karbomer, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i woda oczyszczona.

POSTAĆ PRODUKTU

żel do stosowania na skórę

DZIAŁANIE

Produkt Diclotica zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Lek Diclotica stosowany jest w miejscowym leczeniu:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- w pourazowych stanach zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń)
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat):

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

Nakładać cienkie warstwy żelu Diclótica na bolące miejsca, 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g leku co w przybliżeniu odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400 cm² do 800 cm².

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż 14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanki miękkiej i nie dłużej niż 4 tygodnie w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Należy skonsultować się z lekarzem po 7 dniach leczenia w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Stosowanie u dzieci poniżej 14 lat

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Osoby w podeszłym wieku powyżej 65 lat

Należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.

Po zastosowaniu należy umyć ręce, chyba, że to one są poddawane leczeniu.

Diclótica może być używany jako leczenie wspomagające doustne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku, jeśli pacjent zauważy oznaki jego zepsucia.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4

44 -100 Gliwice

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



SPRAWNE MIĘŚNIE I STAWY

ŻEL Z DIKLOFENAKIEM
działa na ból, stany zapalne i obrzęki

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



diclotica

Diclótica® zawiera diklofenak, który ma działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwbólowe
- przeciwobrzękowe

Produkt leczniczy jest przeznaczony dla osób, które odczuwają dyskomfort spowodowany przez bóle mięśni i stawów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



diclotica

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

- pourazowych stanów zapalnych (swoje, wstrzałki, nacięcia i stawy (np. powięzi) w skutek skopceń, nadwyrzesań lub skręceń)
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgna, białek torebki, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okostnotęśniowe

Dorośli (powyżej 18 lat)
• ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



diclotica

DAWKOWANIE

Nakładaj cienkie warstwy żelu na bolące miejsca 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g leku co w przybliżeniu odpowiada 2,0 - 2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400 cm² do 800 cm².

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.

- ✓ Szybko wchłaniałna konsystencja żelu
- ☀ Żel o naturalnym zapachu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.