

Dicoflor 3, 30 kapsułek



Nasza cena: 47,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	kapsułki
Producent	BAYER POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Dicoflor 3 to suplement w postaci kapsułek.

Dicoflor 3 to probiotyk, który zawiera żywe kultury bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG* (ATCC 53103) o udowodnionym w badaniach klinicznych bezpieczeństwie stosowania.

Dicoflor 3 przeznaczony jest do stosowania u **dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych**.

SKŁADNIKI

maltodekstryna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, liofilizowane żywe kultury bakterii (*Lactobacillus rhamnosus GG*), substancja przeciwzbrylająca: E471

Składnik	Zawartość w 1 kapsułce	Zawartość w 2 kapsułkach
<i>Lactobacillus rhamnosus GG</i>	3 x 10 ⁹ CFU*	6 x 10 ⁹ CFU*

*CFU - jednostka tworząca kolonię bakterii

MASA NETTO

8,1 g (30 kapsułek po 0,27 g)

SPOSÓB UŻYCIA

Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1-2 kapsułki dziennie.

Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką zimnego lub ciepłego płynu (np. woda, mleko, sok owocowy).

Kapsułkę można również otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w płynie (jak wyżej) i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Produkt zaleca się stosować podczas posiłków.

PRZECHOWYWANIE

Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło, z tego względu nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych i na gwałtowne zmiany temperatur.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wymaga przechowywania w lodówce.

Data minimalnej trwałości dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Wyprodukowano w UE dla:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.