

DIH 500 mg, 60 tabletek powlekanych

Nasza cena: 43,88 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMINUM

Opis produktu

Opis

DIH 500 mg, 60 tabletek powlekanych

Tabletki powlekane DIH zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów. DIH zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Dawkowanie - DIH, tabletki powlekane, 500 mg, 60 szt

2 tabletki na dobę podczas posiłku, tj po 1 tabletkę rano i wieczorem. Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę tj. 2 razy po 2 tabletki.

Składniki - DIH, tabletki powlekane, 500 mg, 60 szt

1 tabletkę zawiera substancję czynną 500 mg zmkronizowanej diosminy.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II 85F24220 Pink.

Działania

- Zwiększa napięcie naczyń żylnych
- Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych.

Wskazania - DIH, tabletki powlekane, 500 mg, 60 szt

Objawy niewydolności krążenia żylnego (ból i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg)
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Przeciwwskazania - DIH, tabletki powlekane, 500 mg, 60 szt

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Przeciwwskazania - DIH, tabletki powlekane, 500 mg, 60 szt

Mogą wystąpić: niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.