

Dih Max Comfort 1000 mg, 60 tabletek powlekanych

Nasza cena: 62,96 zł



Opis słownikowy

Dawka	1 G
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMINUM

Opis produktu

Opis

Dih Max Comfort 1000 mg, 60 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletkę powlekaną zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Wskazania do zastosowania:

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

- bóle i nocne kurcze nóg,
- uczucie ciężkości nóg,
- żylaki kończyn dolnych,
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe,
- obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie:

Diosmina wpływa na mikrokążenie i parametry hemoreologiczne krążenia. Wykazuje działanie ochronne wobec naczyń żylnych (dwukrotnie silniejsze od trokserutyny), zmniejsza ich przepuszczalność, zapewnia elastyczność ścian naczyń i zwiększenie ich napięcia (m.in. na skutek przedłużenia skurczu włókien mięśniowych ściany naczyń żylnych w odpowiedzi na noradrenalinę i wzrost wrażliwości miocytów na jony wapniowe).

Poprawiając powrót krwi z układu żylnego kończyn dolnych, zmniejsza nadciśnienie i zastój żylny w kończynach. Hamuje patologiczną aktywację i adhezję leukocytów do ścian naczyń włosowatych, zmniejsza nadmierną lepkość krwi. Dzięki hamowaniu wydzielania mediatorów reakcji zapalnej (hamuje syntezę prostaglandyn i działa przeciwutleniająco, zmniejsza stężenie wolnych rodników, ogranicza uwalnianie histaminy, zmniejsza aktywność hialuronidazy i ceruloplazminy), ma właściwości przeciwzapalne. Diosmina zwiększa przepływ w układzie chłonnym, podwyższa ciśnienie onkotyczne limfy. Tak jak inne flawonoidy, jest uznawana za silny inhibitor

prostaglandyny E2, F2a i tromboksanu (A2 i lub B2), hamujący aktywację, migrację i adhezję leukocytów oraz aktywację neutrofilii.

Sposób użycia:

2 razy dziennie 1 tabletkę podczas posiłku.

W przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych zylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę (2 razy na dobę 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki do 4 tabletek na dobę - 2 razy dziennie 2 tabletki)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.