

# Diklofenak Lgo, żel 100 g

Nasza cena: 15,91 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Postać	ZEL
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICLOFENACUM

## Opis produktu

### Opis

**Diklofenak Lgo** jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

#### Główne składniki i ich działanie:

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenyllooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu stanów zapalnych związanych z chorobami reumatycznymi lub urazami. Po zastosowaniu miejscowym diklofenak przenika przez skórę do tkanek podskórnych, ścięgien, mięśni, tkanek okołostawowych, ma zdolność kumulacji w mazi stawowej. Wchłanianie diklofenaku zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą jest stosowany. Ponadto, dzięki zastosowaniu odpowiedniego podłoża preparat ma także działanie łagodzące i chłodzące.

#### Wskaznia:

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty)
- ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

#### Dawkowanie i sposób użycia:

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości powierzchni, na którą stosowany jest żel. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli

masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: na powierzchnię skóry należy nałożyć ciekłą warstwę żelu delikatnie wcierając. Stosować 3–4 razy na dobę. Zależnie od wielkości powierzchni stosować 2–4 g preparatu (tj. ilość żelu odpowiadającą odpowiednio objętości wiśni lub objętości orzecha włoskiego).

Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu objawy nie ustępują lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem.

Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni (lub 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów).

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**