

## Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.



Nasza cena: 46,66 zł

### Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Diosminex zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

#### Dawkowanie - Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.

Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem), podczas posiłków.

W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

#### Składniki - Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.

(1 tabletki): 500 mg zmikronizowanej diosminy oraz substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lak glinowy żółcieni chinolinowej (E104), lak glinowy indygotyny (E 132), lak glinowy żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny.

#### Działania

Lek Diosminex zawiera zmikronizowaną diosminę. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Diosminex wpływa na mikrokrążenie, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

#### Wskazania - Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.

- Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek
- leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

## Przeciwwskazania - Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.

Uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

## Przeciwwskazania - Diosminex, tabletki powlekane, 500mg, 60 szt.

Zgłaszane działania niepożądane to:

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty
- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurovegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

## Uwagi

Diosminex zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**