

## Dip Hot, krem 67 g

Nasza cena: 17,66 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	67 g
Postać	KREM
Producent	MENTHOLATUM CO.LTD WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	METHYLIS SALICYLAS, MENTHOLUM, EUCALYPTU

### Opis produktu

#### Opis

Jest to lek w postaci kremu o działaniu miejscowo rozgrzewającym.

#### Dawkowanie - Dip Hot, krem 67 g

Dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia:

Delikatnie wcierać preparat w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy na dobę. Po użyciu dokładnie zakręcić tubę z kremem.

Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.

#### Składniki - Dip Hot, krem 67 g

Krem zawiera substancje czynne:

- salicylan metylu 12,80%

- Mentol 5,91%

- olejek eukaliptusowy 1,97%

- olejek terpentynowy 1,47%

- oraz substancje pomocnicze: kwas stearynowy, sól sodowa karboksymetylocelulozy E 466, glikol propylenowy E 1520, trietanolamina, lanolina bezwodna, parafina ciekła, woda.

#### Działania

Wcieranie preparatu w obolałe miejsca powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, poprawę krążenia i uczucie rozgrzania. Wynikiem tego jest zmniejszenie bólów mięśniowych i stawowych.

#### Wskazania - Dip Hot, krem 67 g

Dip Hot Rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej; pomocniczo w gościecu, bólach

reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.

### Przeciwwskazania - Dip Hot, krem 67 g

Rzadko obserwowano występowanie utrzymującego się zaczerwienienia skóry lub duszności po użyciu preparatu przez osoby wrażliwe.

### Uwagi

Zanim zastosuje się lek Dip Hot Rozgrzewający

Przed użyciem należy wypróbować preparat na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii. Nie stosować u osób uczulonych na salicylany i mentol. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Przerwać stosowanie preparatu w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry. Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.

Po użyciu dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania preparatu.

U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem preparatu powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**