

Dip Rilif, żel 50 g



Nasza cena: 18,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50g
Postać	ZEL
Producent	THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM, MENTHOLUM

Opis produktu

Opis

Preparat jest również stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów, artrozach i innych zespołach bólowych. Skojarzone działanie substancji czynnych: ibuprofenu i mentolu powoduje szybkie i długotrwałe uśmierzanie bólu. Badania wykazały, że w zmienionych chorobowo tkankach, ibuprofen osiąga wielokrotnie wyższe stężenia od minimalnych stężeń terapeutycznych. Została potwierdzona wysoka skuteczność kliniczna preparatu oraz ze względu na niskie stężenie ibuprofenu w surowicy krwi - znikoma ilość działań niepożądanych.

W przeciwieństwie do leków doustnych, Dip Rilif nie podrażnia bezpośrednio błony śluzowej żołądka.

Dawkowanie - Dip Rilif, żel 50 g

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu.

Składniki - Dip Rilif, żel 50 g

Substancje czynne:

- Ibuprofen 5%
- Mentol 3%

Substancje pomocnicze:

- Karbomer,
- glikol propylenowy,
- etanol 96%,
- diizopropanolamina,
- woda oczyszczona.

Działania

- zmniejsza stany zapalne
- łagodzi ból
- zmniejsza obrzęk
- działa miejscowo znieczulająco

Dip Rilif działa:

Szybko - skojarzone działanie obu składników szybko i długotrwale uśmierza ból

Skutecznie - w stawie osiąga stężenia wyższe od minimalnych stężeń terapeutycznych, dzięki czemu skutecznie likwiduje stan zapalny

Bezpiecznie - w przeciwieństwie do leków doustnych nie podrażnia błony śluzowej żołądka

Wskazania - Dip Rilif, żel 50 g

- Bóle reumatyczne m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)
- Bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, m.in. bóle zwyrodnieniowe i choroby zwyrodnieniowe stawów
- Bóle pleców, często powiązane z naciskiem uszkodzonych krążków międzykręgowych na sąsiadujące nerwy. Uciskowi towarzyszy duże, bolesne napięcie mięśni pleców
- Lumbago (postrzał)
- Bóle mięśniowe
- Bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach
- Bóle i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych
- Urazy stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów)
- Kontuzje sportowe

Przeciwwskazania - Dip Rilif, żel 50 g

Preparatu nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na składniki preparatu, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
- u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Uwagi

Po użyciu żelu należy:

- zawsze umyć ręce, chyba że są one miejscem zastosowania preparatu
- dokładnie zakręcić tubkę.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.