

# Diphergan 25 mg 20 drażetek

Nasza cena: 31,45 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,025G
Opakowanie	*20
Postać	DRAZ.
Producent	JELFA S.A.JELEŃ GÓRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PROMETHAZINUM

## Opis produktu

### Opis

## Co to jest Diphergan i w jakim celu się go stosuje

Diphergan jest silnym lekiem przeciwhistaminowym o długim czasie działania, wykazującym dodatkowo działanie uspokajające i przeciwwymiotne.

### Lek ten stosuje się:

- w leczeniu objawowym stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry, włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka;
- jako lek wspomagający do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie;
- jako środek przeciwwymiotny, np. w kinetozie (chorobie lokomocyjnej).

## Skład:

### Co zawiera Diphergan

- Substancją czynną leku jest prometazyny chlorowodorek. Jedna tabletki drażowana zawiera 25 mg prometazyny chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to:  
rdzeń tabletki drażowanej: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, żelatyna, talk, sacharyna sodowa, magnezu stearynian. otoczka tabletki drażowanej: sacharoza, talk, guma arabska, czerwień koszenilowa (E 124), Capol 1295 (mieszanka wosku Carnauba i pszczelego).

## Przeciwwskazania:

## Kiedy nie stosować leku Diphergan

- jeśli pacjent ma uczulenie na prometazynę lub inne pochodne fenotiazyny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
- jeśli pacjent ma depresję ośrodkowego układu nerwowego niezależnie od jej podłoża;
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami enzymu monoaminooksydazy (IMAO) oraz po przebytych leczeniu IMAO w okresie 14 dni po odstawieniu tych leków;
- u dzieci w wieku do 2 lat.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy ono od wskazań, wieku pacjenta i jego wrażliwości na działanie leku.

## Zalecana dawka:

### w odczynach alergicznych:

- dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 25 mg raz na dobę (najlepiej na noc), zwiększając maksymalnie do 25 mg dwa razy na dobę w razie potrzeby;
- dzieci od 5 do 10 lat: 10 do 25 mg jednorazowo (najlepiej na noc) lub 5 do 10 mg 2 razy na dobę, maksymalnie 25 mg na dobę;

### w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej:

- dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 25 mg na noc przed podróżą; w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6 – 8 godzinach; w przygotowaniu pacjenta do operacji;
- dorośli i dzieci od 10 lat: 25 do 50 mg na godzinę przed zabiegiem; dzieci od 5 do 10 lat: 25 mg na godzinę przed zabiegiem.

## Stosowanie u dzieci i młodzieży

- Nie stosować u dzieci do 2 lat.
- Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat: stosować lek Diphergan w postaci syropu.
- Stosowanie u dzieci w wieku od 5 lat: stosować w postaci tabletki drażowanej (patrz wyżej).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Zaburzenia układu nerwowego:

- senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji, splątanie, reakcje pozapiramidowe.

### Zaburzenia oka:

- zaburzenia widzenia.

### Zaburzenia żołądka i jelit:

- suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka.

### Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- zatrzymanie moczu.

### Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

- anoreksja.

### Zaburzenia serca:

- kołatania serca, obniżenie ciśnienia krwi (hipotonia), arytmia.

### Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

- kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki.

### Zaburzenia układu immunologicznego:

- anafilaksja, opisywano reakcje skórne nadwrażliwości na światło, w czasie leczenia należy unikać silnego światła słonecznego.

### Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

- nieprawidłowy skład krwi, włączając niedokrwistość hemolityczną.

### Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- żółtaczka.

## Inne leki i Diphergan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Diphergan razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 14 dni po odstawieniu IMAO.

Diphergan nasila działanie leków: przeciwcholinergicznym, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających lub nasennych.

## Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

### Ciąża

W okresie ciąży lek Diphergan może być stosowany tylko za zgodą lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Diphergan w okresie 2 tygodni poprzedzających planowany termin porodu.

### Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią Diphergan można stosować tylko za zgodą lekarza.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować senność, zawroty głowy i zaburzenia orientacji. Objawy te występują najczęściej w okresie pierwszych kilku dni leczenia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu

życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.