

# Dipperam HCT, 10 mg + 160 mg + 25, 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 6,42 zł

## Opis słownikowy

|                   |  |
|-------------------|--|
| Dawka             | 10MG+160MG+25MG                          |
| Opakowanie        | *28                                      |
| Postać            | TABL.POWL.                               |
| Producent         | SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]                 |
| Rejestracja       | Lek na receptę                           |
| Substancja czynna | AMLODIPINUM, VALSARTANUM, HYDROCHLOROTHI |

## Opis produktu

### Opis

## Dipperam HCT, 10 mg + 160 mg + 25, 28 tabletek powlekanych

Tabletki leku Dipperam HCT zawierają trzy substancje czynne: amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd. Wszystkie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze.

- Amlodypina należy do grupy substancji nazywanych antagonistami wapnia. Powstrzymuje transport jonów wapnia do komórek ścian naczyń krwionośnych, co hamuje skurcz naczyń krwionośnych.
- Walsartan należy do grupy substancji nazywanych antagonistami receptorów angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, powodującą skurcz naczyń krwionośnych, zwiększając w ten sposób ciśnienie tętnicze. Walsartan blokuje działanie angiotensyny II.
- Hydrochlorotiazyd należy do grupy tzw. tiazydowych leków moczopędnych. Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie moczu, co również powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

W wyniku wszystkich trzech działań naczynia krwionośne rozkurczają się i zmniejsza się ciśnienie tętnicze.

Lek Dipperam HCT stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd i u których korzystne może być przyjmowanie jednej tabletki zawierającej te trzy substancje czynne.

## Jak stosować lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Dipperam HCT to jedna tabletkę na dobę.

- Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.
- Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
- Lek Dipperam HCT można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Nie należy przyjmować leku Dipperam HCT razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

## Składniki:

Dipperam HCT, 10 mg + 160 mg + 25 mg

Każda tabletkę powlekana zawiera 10 mg amlodypiny, 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazidu.

Pozostałe składniki to:

- celuloza mikrokrystaliczna,
- krospowidon (typ A),
- krzemionka koloidalna bezwodna,
- magnezu stearynian,
- hypromeloza (typ 2910),
- makrogol 4000,
- talk,
- żelaza tlenek żółty

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.