

Distreptaza 6 czopków

Nasza cena: 39,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Postać	CZOPKI
Producent	BIOMED-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	STREPTOKINASUM, STREPTODORNASUM

Opis produktu

Opis

Distreptaza 6 czopków

Distreptaza jest lekiem w postaci czopków doodbytniczych, zawiera substancje czynne streptokinazę i streptodornazę. Distreptaza powoduje upłynnienie skrzepów krwi oraz składników morfotycznych ropy, dzięki czemu antybiotyki, chemioterapeutyki i przeciwciała łatwo docierają do źródeł zakażenia.

Wskazania do zastosowania leku:

- leczenie wspomagające w zapaleniu narządów miednicy mniejszej (PID, ang. pelvic inflammatory disease)
- zespół chorób zapalnych jajników, jajowodów i błony śluzowej macicy;
- choroba zrostowa po operacjach w obrębie miednicy mniejszej;
- ostra (AHD, ang. acute haemorrhoidal disease) i przewlekła choroba hemoroidalna;
- wspomagająco w ropniu okołodbytniczym i przetokach z rozległym naciekiem zapalnym.

Kiedy nie stosować tego leku?

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma rany pokryte świeżym strupem lub szwy chirurgiczne w okolicy podania;
- po krwotokach przez około 10 dni, gdyż może to wywołać ponowne krwawienie;
- z innymi lekami zawierającymi sole wapnia;
- w ostrym zapaleniu tkanki łącznej bez oznak ropienia;
- u pacjentów z obniżoną krzepliwością krwi;
- z antykoagulantami (lekami przeciwzakrzepowymi), ze względu na ryzyko miejscowego krwawienia

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Czoppek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Zalecana dawka

Dorośli

Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego.

W stanach ciężkich stosuje się:

- 3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni
- 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni
- 1 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

lżejszych:

- 2 x po 1 czopku przez 3 dni
- 1x po 1 czopku przez kolejne 4 dni lub
- 2 x po 1 czopku przez 2 dni

Przeciętna ilość czopków stosowanych w kuracji wynosi 8 -18.

Przeciętne leczenie trwa 7 -10 dni

Składniki:

Substancjami czynnymi leku są:

- streptokinaza
- streptodornaza

Substancje pomocnicze to:

- parafina ciekła
- witepsol H15

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.