

Diuver 10 mg 30 tabletek

Nasza cena: 24,72 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TORASEMIDUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- nadciśnienie pierwotne,
- obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca,
- obrzęk płuc,
- obrzęki pochodzenia wątrobowego,
- obrzęki pochodzenia nerkowego.

Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia dolegliwości.

Nadciśnienie pierwotne:

- zaleca się stosować dawkę początkową wynoszącą 2,5 mg doustnie raz na dobę,
- jeżeli istnieje taka konieczność, dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę.
- maksymalny efekt leczniczy osiąga się po stosowaniu leku przez okres co najmniej 12 tygodni.

Obrzęki:

- zaleca się stosowanie dawki wynoszącej 5 mg doustnie raz na dobę,
- dawkę leku można maksymalnie zwiększyć do 20 mg raz na dobę,
- w wyjątkowych przypadkach stosowano 40 mg/dobę.

Działanie:

- moczopędne,
- działa na układ sercowo - naczyniowy

Skład:

1 tabletkę zawiera 10 mg torasemidu. Tabletki 10 mg zawierają 116,88 mg laktozy jednowodnej w tabletkę.

Przeciwwskazania:

Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku:

- nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonilomocznika lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- zaburzenia czynności nerek z bezmoczem,
- śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe,
- niedociśnienie tętnicze,
- laktacja.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania produktu u pacjentów mogą pojawiać się różnego rodzaju działania niepożądane. Warto zauważyć iż działania te mogą pojawiać się jedynie u części pacjentów, a długość ich trwania oraz przebieg mogą różnić się w zależności od pacjenta.

- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
- bóle i zawroty głowy,
- spadki ciśnienia,
- osłabienie,
- senność,
- stany splątania,
- utrata apetytu,
- kurcze mięśniowe,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych.

Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku. Jeżeli u pacjenta wystąpiły którekolwiek z działań niepożądanych powinien on niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.