

Diuver 5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 21,07 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TORASEMIDUM

Opis produktu

Opis

Diuver 5 mg 30 tabletek

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania u pacjentów u których stwierdzono:

- nadciśnienie pierwotne,
- obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca,
- obrzęk płuc,
- obrzęki pochodzenia wątrobowego,
- obrzęki pochodzenia nerkowego.

Dawkowanie:

Nadciśnienie pierwotne:

Zazwyczaj zaleca się stosowanie dawki 2,5 mg doustnie raz na dobę. Jeżeli istnieje taka konieczność dawkę można zwiększyć do 5mg na dobę.

Obrzęki:

Dawka początkowa powinna wynosić 5 mg doustnie raz na dobę. Jeżeli istnieje taka konieczność dawkę można stopniowo zwiększać aż osiągnię się poziom 20mg na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 40 mg na dobę podawanych doustnie.

Należy pamiętać, iż dawkowanie jest ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Lek powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego i według jego zaleceń.

Działanie:

Torasemid należy do diuretyków pętlowych. W małych dawkach jego profil farmakodynamiczny podobny jest do diuretyków tiazydowych, biorąc pod uwagę nasilenie i czas trwania diurezy. W wyższych dawkach torasemid wywołuje szybką diurezę zależną od zastosowanej dawki, charakteryzuje go duża efektywność działania.

Skład:

1 tabletkę zawiera 5 mg torasemidu. Tabletki 5 mg zawierają 58,44 mg laktozy jednowodnej.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować jeżeli u któregokolwiek z pacjentów występują dolegliwości takie jak:

- nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonilomocznika lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- zaburzenia czynności nerek z bezmoczem.
- śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe.
- niedociśnienie tętnicze.
- laktacja.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Do najczęstszych z nich należą:

- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
- hipokaliemia,
- bóle i zawroty głowy,
- spadki ciśnienia,
- osłabienie,
- senność,
- stany splątania,
- utrata apetytu,
- kurcze mięśniowe,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Działania niepożądane nie muszą występować u wszystkich pacjentów przyjmujących lek. Również stopień i nasilenie działań niepożądanych mogą różnić się u poszczególnych pacjentów. W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z

ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.