

Dolgit, 5%, krem, 50 g



Nasza cena: 20,34 zł

Opis słownikowy

Dawka	5%
Opakowanie	50 g
Postać	KREM
Producent	DOLORGIET PHARM. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

Opis produktu

Opis

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Dawkowanie - Dolgit, 5%, krem, 50 g

Do stosowania miejscowego. Pasek kremu lub żelu (długości 4-10 cm) nakłada się i wciera 3-4 razy dziennie w miejsca chorobowo zmienione.

Składniki - Dolgit, 5%, krem, 50 g

100 g kremu zawiera 5 g ibuprofenu

Działania

Niesteroidowy lek przeciwzapalny. Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance. W krótkim czasie po zastosowaniu dochodzi do złagodzenia bólu, zmniejszenia obrzęku i poprawy ruchomości kończyn.

Wskazania - Dolgit, 5%, krem, 50 g

Dolgit jest wskazany do miejscowego leczenia reumatyzmu mięśniowego, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa, stanów zapalnych tkanek miękkich stawów, np. kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebki stawowej), w sztywności barku, bólach krzyża, w następstwie zranień i urazów, np. zmiążdżeń, wylewów, zwichnięć, nadwyrężeń mięśni.

Przeciwwskazania - Dolgit, 5%, krem, 50 g

Nie stosować w nadwrażliwości na ibuprofen oraz inne składniki preparatu (glikol propylenowy, środki konserwujące) lub na kwas acetylosalicylowy. Preparatu Dolgit nie należy stosować na błony śluzowe oraz otwarte rany. Krem nie jest przeznaczony do leczenia dzieci poniżej 14 lat. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Skutki uboczne

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, zaburzenia skóry
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli, duszność
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki różnego typu, świąd pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica, choroby pęcherzowe skóry,
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek
- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: ból brzucha, niestrawność.

Uwagi

Chronić oczy przed preparatem. Należy unikać nadmiernego słonecznego napromieniowania. Ciąża: nie poleca się stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży i u karmiących kobiet.

Pobierz ulotkę Dolgit, 5%, krem, 50 g

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.