

## Dolgit krem 0,05g/g, 100g



Nasza cena: 30,86 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,05 G/G
Opakowanie	100g
Postać	KREM
Producent	DOLORGIET PHARM. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

### Opis produktu

#### Opis

## Dolgit krem 0,05g/g, 100g

Dolgit jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego

#### **Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu:**

- bólów mięśni
- bólu w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatycznych chorób stawów i kręgosłupa
- zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kałek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych)
- bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub zmian powypadkowych (np. stłuczenia, skręcenia).

#### **Sposób użycia:**

Preparat ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

#### **Dorośli i młodzież po 14. roku życia:**

4–10 cm kremu nakładać na zmienione chorobowo miejsca 3–4 razy na dobę i delikatnie wcierać. Nie stosować częściej niż co 4 godziny. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. W przypadku stosowania w jonoforezie nanosić pod katodę.

Nie stosować więcej niż 12 g kremu na dobę (600 mg ibuprofenu).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.