

Doppelherz aktiv Meno Forte, 30 tabletek



Nasza cena: 27,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	QUEISSER PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Zastosowanie:

Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie.

Składniki preparatu:

- ograniczają uderzenia gorąca,
- ułatwiają zasypianie;
- wspomagają koncentrację,
- wzmacniają kości

Działanie:

Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu.

Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, drażliwość lub przygnębienie, gwałtowne bicie serca.

Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych. Dzięki temu posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi i przekazywania odpowiedniego sygnału hormonalnego.

Witaminy z grupy B (B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12) oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B (poza wit. B1) redukują również skutki zmęczenia.

Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości. Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.

Sposób użycia:

1 tabletkę dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.

W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.