

# Duspatalin Retard kapsułki 200mg x 60

Nasza cena: 52,44 zł

## Opis słownikowy

Dawka	200MG
Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	Abbott Holandia [NI]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	MEBEVERINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

**Produkt jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:**

- objawowe leczenie bólów brzucha wywołanych kurczem mięśni gładkich jelit,
- zaburzeń czynnościowe jelit związanych z zespołem jelita drażliwego.

### Dawkowanie:

Produkt ten powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza i według jego ścisłych wskazówek. Nigdy nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

- najczęściej stosowana dawka wynosi 1 kapsułka 200 mg 2 razy na dobę,
- kapsułkę należy przyjmować jedną rano i jedna wieczorem,
- lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem,
- nie ma określonego terminu w jakim można stosować lek,
- w przypadku pominięcia jednej lub większej liczby dawek należy zażyć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.
- nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## Działanie:

- działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego,
- działa rozkurczowo.

## Skład:

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg mebeweryny chlorowodoru.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u któregośkolwiek z pacjentów występują dolegliwości związane z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą pojawić się różnego rodzaju działania niepożądane, do najczęstszych z nich należą:

- nadwrażliwości,
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej,
- pokrzywka,
- obrzęk naczynioruchowy,
- obrzęk twarzy,
- wysypka,
- zaburzenia układu immunologicznego,
- nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne).

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.