


DYNID GEM, 10 tabletek



Nasza cena: 10,38 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	GLENMARK PHARMACEUTICAL CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DESLORATADINUM

Opis produktu

Opis

DYNID GEM, 10 tabletek

Lek Dynid Gem stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Produkt leczniczy Dynid Gem jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletkę Dynid Gem zawiera 5 mg desloratadyny.

Pozostałe składniki leku: celuloza mikrokrystaliczna (typ 112); laktoza jednowodna; skrobia kukurydziana; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka produktu leczniczego Dynid Gem to jedna tabletkę raz na dobę.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta.

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Lek Dynid Gem należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.