

## Efferalgan, czopki dla dzieci, 300 mg, 10 szt.



Nasza cena: 15,50 zł

### Opis słownikowy

Dawka	300MG
Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Nieopioidowy lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

#### Kiedy stosować:

Bóle różnego pochodzenia, gorączka, leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

#### Kiedy nie stosować:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, stosowanie inhibitorów MAO równoległe lub w ciągu ostatnich 14 dni, równoległe stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna), przebyte ostatnio zapalenie odbytu, odbyticy, krwawienie z odbytu.

#### Dawkowanie:

Dzieci.

Doodbytniczo 60 mg/kg mc./d w 4 daw. podz. (co 6 h): 1.-4. mż. (4-6 kg mc.) 80 mg 1-4 x/d; 6.-24. mż. (8-12 kg mc.) 150 mg 1-4 x/d; 4.-9. rż. (15-24 kg mc.) 300 mg 1-4 x/d.

Nie stosować częściej niż co 4 h (w niewydolności nerek co 8 h).

#### Kiedy zachować szczególną ostrożność:

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy jednocześnie stosować innych preparatów zawierających paracetamol. U dzieci do 2.

roku życia stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Nie stosować u dzieci z biegunką. Stosując preparat u dzieci, należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała. Jeżeli u dzieci stosowana jest dawka 60 mg/kg mc./d, stosowanie innych leków przeciwgorączkowych można rozważyć jedynie w przypadku niewystarczającego działania. Nie stosować dawek większych niż zalecane ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zwykle po 2 dniach od podania leku, a ich maksymalne nasilenie występuje zwykle po 4–6 dniach od podania leku. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń uszkodzenia wątroby należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Stosowanie długotrwałe, częste lub w dużych dawkach zwiększa ryzyko wystąpienia miejscowego podrażnienia. Należy zachować ostrożność u pacjentów: uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego (ryzyko reakcji alergicznej); z niewydolnością wątroby i/lub nerek; odwodnionych lub niedożywionych; chorych na chorobę alkoholową. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. W czasie leczenia nie wolno spożywać alkoholu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**