

Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

Nasza cena: 15,50 zł



Opis słownikowy

Dawka	80MG
Opakowanie	*10
Postać	CZOPKI
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawowym bólu i stanów gorączkowych.

Dawkowanie - Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

U dzieci należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała: dla niemowląt i dzieci o masie ciała od 8 do 12 kg (wiek około 6-24 miesiące) właściwa dawka to 1 czopek, w razie konieczności co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.

Zalecana dawka dobową to 60mg/kg masy ciała - należy ją podać w 4 dawkach podzielonych po 15mg/kg mc. co 6 godzin.

Dorośli i dzieci powyżej 50kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4g na dobę.

Podawane doodbytniczo.

Składniki - Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

Paracetamol 80 mg, substancja pomocnicza: półsyntetyczne glicerydy

Działania

Lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy

Wskazania - Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

Gorączka, leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia

Przeciwwskazania - Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Mniej niż 5% pacjentów z nadwrażliwością na pochodne kwasu acetylosalicylowego może również być uczulona na paracetamol.

Przeciwwskazania - Efferalgan, czopki dla dzieci, 80 mg, 10 szt.

Bardzo rzadko: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w konkretnym przypadku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.