

# Efferalgan Forte Folia 1000 mg, 8 tabletek musujących



Nasza cena: 9,61 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	*8
Postać	TABL.MUS.
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

## Opis produktu

### Opis

Efferalgan Forte jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciw-gorączkowym. Obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka.

### Dawkowanie - Efferalgan Forte Folia 1000 mg, 8 tabletek musujących

Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Forte to: - Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 50 kg (w wieku powyżej 15 lat): dawka jednorazowa wynosi jedną lub dwie tabletki co 6 do 8 godzin (do 3 razy na dobę). W razie konieczności dawkę można powtórzyć, lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej dawki paracetamolu większej niż 3 tabletki (3 g) na dobę. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dobowej dawki 4 tabletki (4 g) na dobę. Należy zawsze zachować przynajmniej 4 godzinny odstęp pomiędzy dawkami.

Osoby w podeszłym wieku: nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.

U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g na dobę (4 tabletki).

### Składniki - Efferalgan Forte Folia 1000 mg, 8 tabletek musujących

Skład: 1 tabletkę musującą zawiera substancję czynną: paracetamol 1 g oraz substancje pomocnicze w tym sorbitol oraz sacharynę sodową.

### Wskazania - Efferalgan Forte Folia 1000 mg, 8 tabletek musujących

- Ból różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne).
- Gorączka.

## Przeciwwskazania - Efferalgan Forte Folia 1000 mg, 8 tabletek musujących

Kiedy nie stosować leku Efferalgan Forte:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan Forte,
- u osób o masie ciała mniejszej niż 50 kg!
- u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.
- jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa.
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia.
- w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną.

Tej postaci leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

### Uwagi

Efferalgan Forte zawiera paracetamol i należy go stosować z uwzględnieniem jednoczesnego przyjmowania innych preparatów zawierających paracetamol, aby nie stosować dawki dobowej większej niż zalecana.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dawek większych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Efferalgan Forte nie wpływa na sprawność psychofizyczną. Brak jest przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ten lek zawiera sorbitol i dlatego nie należy podawać go w przypadku rzadko występującej, dziedzicznej nietolerancji fruktozy.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**