

Egiramlon 10 mg + 10 mg 30 kapsułek

Nasza cena: 5,36 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,01G+0,01G
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	EGIS PHARMACEUTICALIS LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	RAMIPRILUM, AMLODIPINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany w leczeniu zastępczym nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego i według jego zaleceń. Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, a jej wielkość jest zależna od stopnia zaawansowania choroby oraz wyników przeprowadzonych badań oraz wywiadu z pacjentem.

Lek jest zalecany wyłącznie u pacjentów, u których podczas ustalania dawki podtrzymującej ramiprylu optymalna okazała się dawka 2,5 mg.

Wszelkie niezbędne dane na temat stosowania leku zostały również zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Działanie:

Produkt wykazuje działanie przyczyniające się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Skład:

1 kapsułka twarda zawiera 10 mg ramiprylu oraz 10 mg amlodypiny (w postaci 13,9 mg amlodypiny bezyłanu).

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u pacjenta występują dolegliwości takie jak:

- obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie,
- znaczne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki,
- II i III trymestr ciąży,
- niedociśnienie lub niestabilności hemodynamiczne,
- jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z produktami zawierającymi aliskiren,
- wstrząs (w tym wstrząs kardiogeny),
- zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aorty znacznego stopnia),
- niestabilna hemodynamicznie niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego,
- nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny, inhibitory ACE lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych pojawiających się podczas stosowania leku można zaliczyć:

- uporczywy suchy kaszel,
- obrzęk naczynioruchowy,
- hiperkaliemię,
- zaburzenie czynności nerek i wątroby,
- zapalenie trzustki,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- niedociśnienie ortostatyczne,
- omdlenie,
- suchy, drażniący kaszel,
- zapalenie oskrzeli,
- zapalenie zatok przynosowych,
- duszność,
- zapalenie żołądka i jelit,
- zaburzenia trawienia,
- dyskomfort w jamie brzusznej,
- niestrawność,

- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- wysypka,
- kurcze mięśni,
- ból mięśni.

Dokładniejsze dane na temat częstotliwości powstawania działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jeżeli u pacjenta pojawią się jakiegokolwiek z działań niepożądanych powinien on niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Wszelkich informacji na temat działań niepożądanych może udzielić również farmaceuta w aptece.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.