


Elektrolity smak pomarańczowy saszetki x 7

Nasza cena: 11,07 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*7
Postać	Saszetki
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Typ Produktu	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Składniki Elektrolitów po rozpuszczeniu w wodzie rozpadają się na jony obdarzone dodatnim lub ujemnym ładunkiem elektrycznym. Przenikają one przez komórki jelita do sąsiednich tkanek, a związane z nimi ładunki elektryczne przyciągają wodę i zasysają ją z jelita do tkanek.

Bardzo ważnym elementem składu Elektrolitów jest też glukoza. Wbrew powszechnej opinii jej obecność nie ma na celu poprawy walorów smakowych. Elektrolity dzięki połączeniu z glukozą są łatwiej wychwytywane i skuteczniej transportowane do tkanek.

Dzięki Elektrolitom rekomendowanym przez Stoperan więcej wody znajduje się w tkankach, a mniej w jelicie. Tym samym stosowanie ich w trakcie biegunki nie tylko nie dopuszcza do odwodnienia, ale także może ograniczyć intensywność samej dolegliwości.

Przeznaczenie:

Elektrolity mogą być stosowane przez dzieci od 3. roku życia i wszystkich dorosłych z biegunką, w tym kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby w podeszłym wieku.

Elektrolity mogą być stosowane także w innych sytuacjach związanych z nadmierną utratą wody i soli mineralnych, takich jak: wymioty, gorączka, wzmożony wysiłek fizyczny, nadmierne pocenie się (np. w upalne dni), a także przez chorych z chorobami przewlekłymi: cukrzycą, nadciśnieniem (leczonym za pomocą leków z grupy diuretyków) lub chorobami nerek.

Ostrożność powinni zachować chorzy z cukrzycą (z uwagi na zawartość glukozy) oraz chorzy leczący nadciśnienie spirolonaktonem lub inhibitorami ACE (z uwagi na zawartość sodu i potasu).

Sposób użycia:

Elektrolity należy podawać od pierwszej chwili wystąpienia biegunki (a także wymiotów).

Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml wody i podawać małymi porcjami.

Należy oszacować straty wody i w zależności od rezultatu w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania podać do 1200 ml płynu. Po tym czasie można kontynuować nawadnianie podtrzymujące – 100 ml płynu po każdym wypróżnieniu (lub wymiotach).

W przypadku problemów z połykaniem płyn należy podawać często i małymi porcjami (np. kroplomierzem lub łyżeczką). Przed podaniem wskazane jest schłodzenie płynu w lodówce, gdyż w takiej formie jest lepiej tolerowany.

Płynu nie należy mieszać z innymi napojami, ponieważ ich składniki mogą obniżać wchłanianie wody i soli mineralnych. Płynu nie należy także dosładzać – odpowiednie stężenie glukozy w Elektrolitach gwarantuje optymalne wchłanianie wody.