

Elicea 10 mg 28 tabletek

Nasza cena: 21,17 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ESCITALOPRAMUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Leczenie epizodów dużej depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń lękowych z napadami lęków z agorafobią lub bez agorafobii. Leczenie fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych.

Dawkowanie:

Lek do stosowania doustnego. Stosowanie ściśle według zaleceń lekarza. Nie należy go używać w innych okolicznościach bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Przed użyciem należy zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce. Nie należy stosować leku po terminie ważności.

Działanie:

Przeciwdepresyjne

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg escytopramu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane występują najczęściej w pierwszym lub drugim tygodniu leczenia, a ich nasilenie na ogół ulega zmniejszeniu wraz z kontynuacją leczenia. Znane reakcje niepożądane: małopłytkowość, reakcja anafilaktyczna, niepoprawne wydzielanie hormonu ADH, zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia, jadłowstręt, lęk, niepokój, zmniejszenie popędu płciowego u kobiet, brak orgazmu, pobudzenie, nerwowość, napady panicznego lęku, agresja, omamy, myśli i zachowania samobójcze, częste bóle głowy, bezsenność, nadmierna senność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenia, zaburzenia ruchowe, drgawki, niepokój psychoruchowy, szumy uszne, tachykardia, bradykardia, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia układu oddechowego, kłatki piersiowej i śródpiersia, zapalenie zatok, ziewanie, krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej, krwawienia z przewodu pokarmowego, w tym również z odbytu. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, nasiloną potliwość, pokrzywka, świąd, wysypka, wylew podskórny. Bóle stawów, bóle mięśni, zatrzymanie moczu. U mężczyzn zdarzają się przypadki zaburzenia wytrysku, impotencja. U kobiet może wystąpić krwotok maciczny, krwotok miesięczkowy.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.