

# Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml



Nasza cena: 37,97 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1%
Opakowanie	50 ml
Postać	AEROL
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	INDOMETACINUM

## Opis produktu

### Opis

Preparat stosowany zewnętrznie miejscowo w bólach i stanach zapalnych stawów, ścięgien, mięśni. Preparat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

### Dawkowanie - Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml

Lek nakłada się 3 do 5 razy na dobę. Jednokrotna dawka odpowiada zazwyczaj 10 naciśnięciom aplikatora. Maksymalna dawka dobowego preparatu wynosi 25 ml.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

### Składniki - Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml

Indometacyna 1g roztworu zawiera 10mg indometacyny. Pozostałe składniki to : alkohol izopropylowy, izopropylu mirystynian, olejek zapachowy

### Działania

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.

### Wskazania - Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml

Do objawowego, miejscowego stosowania w leczeniu bólu spowodowanego:

- skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia
- stanem zapalnym tkanek miękkich np..zapalenie ścięgien i pochewek ścięgien, torebek stawowych, zesztywnienie stawu barkowego,

- zaostrzeniami choroby zwyrodnieniowej stawów

## Przeciwwskazania - Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml

Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku, astma, podrażnienia skóry, objawy alergiczne. Nie należy stosować leku na otwarte rany, błony śluzowe lub do oczu, podczas ostatniego, trzeciego trymestru ciąży oraz u dzieci i młodzieży

## Przeciwwskazania - Elmetacin, aerozol, 1%, 50 ml

Miejscowe nadmierne podrażnienie skóry u osób wrażliwych (swędzenie, wysypka, wyprysk). W przypadku ogólnoustrojowego wchłonięcia znacznych ilości indometacyny (nieprawidłowe dawkowanie, przyjmowanie doustnie dużych dawek) mogą wystąpić objawy jak przy stosowaniu ogólnym: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, zaparcia lub biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, owrzodzenia i krwawienia przewodu pokarmowego, nawrót choroby wrzodowej), zaburzenia łaknienia.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**