

# Enarenal 5 mg 60 tabletek

Nasza cena: 5,21 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,005G
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ENALAPRILUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

**Lek jest wskazany do stosowania przez pacjentów u których konieczne jest:**

- leczenie nadciśnienia tętniczego,
- leczenie objawowej niewydolności serca,
- zapobieganie objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca.

### Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego i powinien być przyjmowany zgodnie z jego zaleceniami.

### Nadciśnienie tętnicze:

- dawka początkowa produktu leczniczego wynosi od 5 do maksymalnie 20 mg raz na dobę
- w nadciśnieniu tętniczym łagodnym, zalecana dawka początkowa wynosi od 5 do 10 mg.

### Niewydolność serca/ bezobjawowe zaburzenia czynności (dysfunkcja) lewej komory serca:

- dawka początkowa wynosi 2,5 mg, należy ją podawać pod ścisłym nadzorem lekarza w celu ustalenia wpływu na ciśnienie tętnicze na początku leczenia.

## Działanie:

Enalaprylu maleinian jest prolekiem (pochodną dwóch aminokwasów, L-alaniny i L-proliny). Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) jest dipeptydazą peptydylu katalizującą przekształcanie angiotensyny I do substancji wywołującej skurcz naczyń krwionośnych - angiotensyny II. Po wchłonięciu, enalapryl jest hydrolizowany do enalaprylatu, który hamuje ACE. W wyniku hamowania ACE następuje zmniejszenie angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reniny w osoczu (w następstwie zahamowania ujemnego sprzężenia zwrotnego uwalniania reniny), a w konsekwencji do zmniejszonego wydzielania aldosteronu.

## Skład:

1 tabletką zawiera w swoim składzie 5 mg enalaprylu maleinianu.

## Przeciwwskazania:

**Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta występują którekolwiek z przeciwwskazań do stosowania:**

- nadwrażliwość na substancję czynną, inny inhibitor ACE lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z produktami zawierającymi aliskiren
- obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE.
- dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.
- II i III trymestr ciąży.

## Działania niepożądane:

- bóle głowy,
- depresja,
- niedociśnienie
- omdlenie,
- ból w klatce piersiowej,
- zaburzenia rytmu serca,
- dławica piersiowa,
- tachykardia,
- kaszel,
- duszność,
- nudności,
- biegunka,
- ból brzucha,
- zaburzenia smaku,
- wysypka,

W celu uzyskania informacji na temat innych działań niepożądanych mogących występować podczas stosowania leku należy zasięgnąć informacji lekarza prowadzącego bądź też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.