

Encorton 10 mg 20 tabletek

Nasza cena: 12,52 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*20 (BLISTER)
Postać	Tabletki
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PREDNISONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- choroby układu endokrynnego (niewydolność kory nadnerczy pierwotna, wrodzona hiperplazja nadnerczy, hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową, zapalenie tarczycy)
- choroby alergiczne o ciężkim przebiegu (atopowe zapalenie skóry; choroba posurowicza)
- choroby skóry i błon śluzowych(ziarniniak grzybiasty; pęcherzyca; ciężka łuszczyca)
- choroby przewodu pokarmowego(wrzodziejące zapalenie okrężnicy; choroba Leśniowskiego-Crohna)
- choroby układu krwiotwórczego(niedokrwistość aplastyczna wrodzona; niedokrwistość wskutek wybiórczej hipoplazji układu czerwokrwinkowego; małopłytkowość wtórna u dorosłych)
- choroby nowotworowe
- choroby oka(zapalenie tęczówki,zapalenie naczyńiówki i siatkówki)
- choroby neurologiczne(
- choroby układu oddechowego
- choroby reumatyczne

Dawkowanie

Dawkę należy ustalać indywidualnie, zależnie od rodzaju choroby i odpowiedzi na leczenie

Działanie

Lek wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Prednizolon hamuje rozwój objawów zapalenia, nie wpływając na jego przyczynę. Lek powoduje zmniejszenie rozszerzalności i przepuszczalności naczyń włosowatych. Zmniejsza przyleganie leukocytów do śródbłonna

naczyń włosowatych prowadząc zarówno do zahamowania migracji leukocytów jak i tworzenia obrzęków.

Skład

1 tabletkę zawiera 10 mg prednizonu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną prednizon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Układowe zakażenia grzybicze.

Działania niepożądane

Podczas zastosowania krótkotrwałego prednizonu tylko wyjątkowo pojawiają się działania niepożądane

Ryzyko działań niepożądanych, podanych poniżej dotyczy przede wszystkim pacjentów, otrzymujących prednizon długotrwanie.

Mogą pojawić się: osłabienie mięśni, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wtórna niedoczynność kory nadnerczy i przysadki, zapalenie trzustki; wzdęcia; wrzodziejące zapalenie przetyku, zaburzenia trawienia.

Reakcje anafilaktyczne i nadwrażliwość, nudności, złe samopoczucie, zaburzenia snu, retencja sodu, retencja płynów, zastoinowa niewydolność krążenia, utrata potasu, nadciśnienie, zasadowica hipokaliemiczna

Ujemny bilans azotowy, hiperglikemia, glukozuria, wzrost mc., zwiększone łaknienie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Wytwórca
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.