

Enterol 250 mg, 10 kapsułek



Nasza cena: 25,68 zł

Opis słownikowy

Dawka	250MG
Opakowanie	*10
Postać	KAPS.
Producent	LAB.BIOCODEX FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SACCHAROMYCES BOULARDII

Opis produktu

Opis

Enterol 250 mg, 10 kapsułek

Enterol to doustny lek przeciwbiegunkowy.

Wskazania

- W ostrych biegunkach bakteryjnych, przebiegających bez krwi w kale i bez znacznego odczynu ogólnego, jako dodatek do nawodnienia u dorosłych i dzieci.
- Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków.
- Jako dodatek do leczenia antybiotykami, w nawracających zakażeniach Clostridium difficile.
- Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym.

Działanie

W czasie pasażu przez przewód pokarmowy żywe *Saccharomyces boulardii* wywierają działanie biologiczne zbliżone do działania ochronnego naturalnej flory jelitowej. Hamuje działanie chorobotwórcze niektórych drobnoustrojów i (lub) wydzielanych przez nie toksyn, szczególnie *Clostridium difficile*, będącego główną przyczyną biegunek związanych ze stosowaniem antybiotyków, a także *Vibrio cholerae*, typowej bakterii wytwarzającej toksyny i powodującej biegunkę sekrecyjną.

Dawkowanie

Lek do podawania doustnego. 1 do 2 kapsułek na dobę.
Kapsułki należy połykać popijając wodą.

Skład

Jedna kapsułka zawiera:

substancję czynną: 250mg liofilizowanych drożdżaków *Saccharomyces boulardii* 250mg

substancje pomocniczą: latulozę jednowodną, magnezu starynian; skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku
- pacjentów z założonymi wkłuciami do żyły centralnej

Możliwe działanie niepożądane

Mogą wystąpić bóle w nadbrzuszu i wzdęcia, zwykle nie wymagające przerwania stosowania leku. Bardzo rzadko może wystąpić fungemia.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.