


Enterol 250 mg, kapsułki, 20 sztuk

Nasza cena: 47,04 zł



Opis słownikowy

Dawka	250MG
Opakowanie	*20
Postać	KAPS.
Producent	Biodex Francja [Fr]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SACCHAROMYCES BOULARDII

Opis produktu

OPIS

Enterol 250 mg to lek probiotyczny stosowany jako:

- probiotyk do antybiotyku
- lek na biegunkę

Przywraca równowagę mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Zawiera laktozę.

SKŁAD

1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną - szczegółowe informacje w ulotce.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian; składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna, tytanu dwutlenek.

DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego. Kapsułkę połknąć popijając szklanką wody.

ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia;

biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii;

biegunka spowodowana zakażeniem *C.difficile*: 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni;

biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułki na dobę;

biegunka podróży: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

Kapsułki można otworzyć a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem

dla dziecka.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu.

WSKAZANIA

- Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych
- Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków
- Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronizadolem
- Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym
- Zapobieganie biegunkom podróźnych

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Enterol 250:

- jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej,
- u pacjentów w stanie krytycznym lub u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):

- wzdęcia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd,
- reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy,
- wysypka na całym ciele (osutka).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

Lek zawiera laktozę - nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Enterol jednocześnie (w tym samym momencie) z innymi doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi (leki stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych), gdyż może to obniżyć jego skuteczność.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża: Nie zaleca się stosowania produktu Enterol 250 w czasie ciąży.

Laktacja: *Saccharomyces boulardii* nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem produktu Enterol 250 w okresie karmienia piersią.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

BIOCODEX
7 avenue Gallieni

94250 Gentilly
Francja

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.