

Envil Gardło, tabletki do ssania, 20 szt.



Nasza cena: 14,75 zł

Opis słownikowy

Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETYLPYRIDINIUM, LIDOCAINUM, ZINCUM

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Envil Gardło, tabletki do ssania, 20 szt.

Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed lub po posiłku.

Składniki - Envil Gardło, tabletki do ssania, 20 szt.

Każda tabletkę do ssania zawiera: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0 mg chlorowodoru lidokainy i 17,42 mg cynku glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

Działania

Envil zawiera takie połączenie substancji aktywnych dzięki którym zwalcza ból gardła, stany zapalne gardła wywołane przez wirusy i bakterie a także wspomaga odporność

Wskazania - Envil Gardło, tabletki do ssania, 20 szt.

Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

- stanach zapalnych gardła i jamy ustnej,
- zapaleniu dziąseł,
- zakażeniach i owrzodzeniach błony śluzowej jamy ustnej (afty, pleśniawki),
- zapobieganiu tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych przebiegających z bólem gardła i w zapaleniu migdałków (angina).

Przeciwwskazania - Envil Gardło, tabletki do ssania, 20 szt.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów oraz na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Wrodzona lub idiopatyczna methemoglobinemia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Możliwe działania niepożądane:

miejscowe reakcje skórne tj. rumień, świąd, wyprysk, pieczenie

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.