

Erdomed 35 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 ml

Nasza cena: 22,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100ml
Postać	PROSZEK
Producent	MEDAGRO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ERDOSTEINUM

Opis produktu

Opis

Erdomed 35 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 ml

Substancją czynną preparatu jest erdosteina. Erdosteina jest pochodną aminokwasu metioniny. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość i powoduje upłynnienie zalegającej wydzieliny, a także wpływa na poprawę czynności rzęsek nabłonka oddechowego. W ten sposób wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, nie zaburza naturalnego odruchu kaszlowego.

Ponadto, obecność wolnych grup sulfhydrylowych w metabolitach erdosteiny zmniejsza adhezję bakterii do nabłonka błon śluzowych dróg oddechowych i zmniejsza nasilenie kolonizacji bakteryjnej. Erdosteina zwiększa stężenie amoksycyliny w wydzielinie oskrzelowej, co zwiększa skuteczność antybiotyku.

Wskazania

Leczenie ostrych i przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc połączonych z nieprawidłowym wydzielaniem i transportem wydzieliny śluzowej. Leczenie zapobiegawcze sezonowych zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować preparatu Erdomed - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na substancje zawierające grupy sulfhydrylowe –SH.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są:

- zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
- niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min)
- homocystynuria (zaburzenie metabolizmu aminokwasów), zwłaszcza w przypadku stosowania diety wykluczającej aminokwas metioninę.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Preparatu nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.

Substancja czynna

Erdosteinum

Pozostałe składni preparatu

- preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
- preparat zawiera sacharozę; należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę
- preparat zawiera benzoesan sodu.

Dawkowanie

Preparat ma postać proszku w butelce do przygotowania roztworu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Aby przygotować roztwór należy dodać do butelki wodę o temp. pokojowej (do zaznaczonego na butelce wgłębienia). Dobrze wytrząsnąć do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. W razie potrzeby ponownie uzupełnić wodą do zagłębienia i ponownie wytrząsnąć. W ten sposób uzyskuje się 100 ml gotowej zawiesiny. Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce (temp. 2–8°C) nie dłużej niż 10 dni.

Preparat należy zawsze dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Dzieci po ukończeniu 2. roku życia:

dawkowanie ustali lekarz, w zależności od masy ciała; zwykle stosuje się 10 mg/kg masy ciała w 2 dawkach podzielonych:

- masa ciała 15–20 kg: 2,5 ml 2 razy na dobę,
- masa ciała 21–30 kg: 5 ml 2 razy na dobę,
- masa ciała powyżej 30 kg: 7,5 ml 2 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Preparatu nie należy stosować przed snem.

Czy można stosować Erdomed - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu chorób dróg oddechowych, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, erytromycyna, amoksycylina, kotrimoksazol.

Równoległe stosowanie preparatu i amoksycyliny powoduje zwiększenie stężenia amoksycyliny w drogach oddechowych.

Nie należy przyjmować równoległe leków hamujących odruch kaszlowy (leków przeciwkaszlowych), ponieważ odruch ten sprzyja usuwaniu powstałej po upłynięciu dużej ilości wydzieliny. Nagromadzenie dużej ilości wydzieliny oskrzelowej może wpłynąć na pogorszenie wydolności oddechowej.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, również Erdomed może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, zgaga, biegunka, zaparcia, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, ból w nadbrzuszu, ból głowy, zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.