

Esberitox N, 40 tabletek



Nasza cena: 25,66 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG+7,5MG+2MG
Opakowanie	*40
Postać	Tabletki
Producent	SCHAPER AND BRUMMER NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BAPTISIAE TINCTORIAE RADICE EXTRACTUM SP

Opis produktu

Opis

Esberitox N, 40 tabletek

Esberitox N jest lekiem roślinnym zawierającym w swoim składzie substancje czynne:

- *Baptisiae tinctoriae radix* - korzeń dzikiego indygo;
- *Echinaceae purpureae radix* - korzeń jeżówki purpurowej;
- *Thujae occidentalis herba* - wyciąg z ziela żywotnika zachodniego.

Wskazania do stosowania Esberitox N:

Esberitox N to roślinny produkt leczniczy zalecany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający. Ma za zadanie skrócić czas infekcji i złagodzić jej przebieg.

Skład leku Esberitox N

Zawartość w 1 tabletkę:

0,215 ml alkoholowo-wodnego wyciągu (1:11) odpowiadającego:

Baptisiae tinctoriae radice 10 mg

Echinaceae purpureae radice 7,5 mg

Thujae occidentalis herba 2 mg

ekstrahent: etanol 30% (v/v)

Substancje pomocnicze: laktoza, tearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Dawkowanie Esberitox N

Dorośli: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego w przypadku stosowania należy zachować szczególną ostrożność.

Sposób użycia Esberitox N

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą.

W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek.

Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak niż 10 dni.

Esberitox N u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 lat. Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Dawkowanie Esberitox N

Młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.

Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.

Przeciwwskazania w stosowaniu leku Esberitox N

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae, np. rumianek, arnikę.

Istnieją zasadnicze przyczyny do niestosowania leku w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne.

Nie stosować w przypadku immunosupresji (np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Sposób przechowywania

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Środki ostrożności

Esberitox N jest lekiem. Dla bezpieczeństwa należy stosować go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni

przyjmować tabletek Esberitox N.

Esberitox N a ciąża, karmienie piersią i płodność

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność.

Esberitox N a prowadzenie pojazdów

Nie badano. Uważa się, że lek nie osłabia zdolności psychomotorycznych, zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Esberitox N a inne leki

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Producent

SCHAPER & BRUEMMER

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.