

## Esceven żel, 30 g

Nasza cena: 18,10 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	ZEL
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AESCULUS HIPPOCASTANUM, HEPARINUM

### Opis produktu

#### Opis

#### Esceven żel, 30 g

*Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum natricum*  
(83,5 mg + 50 j.m.)/g, żel

#### Skład:

##### Substancje czynne:

wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (*Hippocastani seminis extractum spissum*; DER: 6-9:1) - 83,5 mg/g; heparyna sodowa (*Heparinum natricum*) - 50 j.m./g.

##### Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

bronopol, etylu parahydroksybenzoesan.

#### Wskazania do stosowania:

Esceven w postaci żelu jest produktem leczniczym tradycyjnie stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żylnnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk. Stosowany u osób powyżej 12 roku życia.

#### Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4 cm) wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować żelu Esceven, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki produktu. Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu, w stanach przewlekłych schorzeń nerek.

## Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się produktu w okolice oczu, przemyć wodą.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu u dzieci. Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe). Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

## Działania niepożądane:

Jak każdy produkt leczniczy, Esceven może powodować działania niepożądane. Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**