

Espumisan, krople doustne, 40 mg/ml, 30 ml



Nasza cena: 21,18 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,04 G/1ML
Opakowanie	30 ml
Postać	KROP.DOUSTNE
Producent	BERLIN CHEMIE AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SIMETICONUM

Opis produktu

Opis

Espumisan, krople doustne, 40 mg/ml, 30 ml

Preparat stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (wzdęcia), również po zabiegach chirurgicznych. Jako środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (badania radiologiczne, ultrasonograficzne, gastroskopowe).

Dawkowanie

W dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym:

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 20-40 kropeł na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych. Całkowita dawka dobową nie większą niż 40 kropeł. Lek należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.

Dzieci od 6 do 14 lat: 20-40 kropeł 3 do 5 razy na dobę.

Młodzież i dorośli: 40 kropeł 3-5 razy na dobę.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej: 40 kropeł leku 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie oraz 40 kropeł rano w dniu badania na czczo.

Jako substancja pomocnicza podawana razem ze środkami kontrastowymi: 80-160 kropeł leku na 1 litr płynu kontrastowego.

Jako odtrutka w zatruciach detergentami: dorośli: w zależności od ciężkości zatrucia, zazwyczaj stosuje się 10 do 20 ml co odpowiada 1-2 łyżkom stołowym leku. dzieci: w zależności od ciężkości zatrucia, zazwyczaj stosuje się 2,5 do 10 ml leku co odpowiada 1/2-2

łyżeczkom od herbaty.

Skład

substancja czynna: symetykon 1 ml zawiera 40 mg
substancje pomocnicze: kwas sorbowy

Wskazania

Leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym takich jak np. wzdęcia i kolka niemowlęca. Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia. Wspomagająco w przygotowaniu pacjenta do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii.

Przeciwwskazania

Niemowlęta w 1 miesiącu życia.

Możliwe działania niepożądane

Nie odnotowano.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.