

Exoderil krem 1% 15g



Nasza cena: 18,13 zł

Opis słownikowy

Dawka	1%
Opakowanie	15 g
Postać	KREM
Producent	Sandoz Gmbh Kundl
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry, takich jak:

- grzybica skóry i fałdów skórnych, np. grzybica skóry gładkiej, grzybica pachwin (często swędzące, nieregularne, różowo-czerwone, lekko wzniesione plamy, na których obwodzie mogą pojawiać się grudki i pęcherzyki);
- grzybica międzypalcowa (grzybica dłoni, grzybica stóp), objawiająca się najczęściej nadmiernym łuszczeniem się i pękaniem skóry, ze świądem i pieczeniem;
- zakażenie skóry wywołane przez drożdżaki (zakażenie takie zwane jest także kandydozą lub drożdżycą), objawiające się swędzącymi, zaczerwienionymi, często złuszczącymi się plamami, w których otoczeniu mogą powstawać pęcherzyki;
- łupież pstry (plamiste zmiany w kolorze od białego do brązowego, nieregularne, o złuszczonej powierzchni, występujące głównie na skórze tułowia; zmiany te nie zmieniają barwy pod wpływem słońca).

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na naftyfinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Skład: 1 gram kremu zawiera 10 mg naftyfiny chlorowodoru. Lek zawiera alkohol benzylowy.

Dawkowanie i sposób podawania:

Stosować miejscowo na skórę.

Dorośli:

Produkt **Exoderil** należy nanosić cienką warstwą jeden raz na dobę na zmienioną chorobowo skórę oraz na okolice miejsc zmienionych chorobowo.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego skórę należy umyć i wysuszyć. Ustąpienie objawów zakażenia (takich jak świąd i pieczenie) zwykle następuje szybko.

Krem Exoderil należy stosować co najmniej 7 dni.

Lek Exoderil powinno się stosować jeszcze przez 2 tygodnie po ustąpieniu objawów w celu całkowitego wyleczenia choroby.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.