

Febrisan, 8 saszetek



Nasza cena: 16,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	5G
Opakowanie	*8
Postać	Saszetki
Producent	Altana Pharma
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Lek przeciwko objawom przeziębienia i grypy.

Dawkowanie - Febrisan, 8 saszetek

Stosować doustnie dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Przed zażyciem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Składniki - Febrisan, 8 saszetek

1 saszetka zawiera:

5 g proszku musującego o składzie: paracetamol – 750mg, kwas askorbinowy – 60mg, fenylefryny chlorowodorek – 10mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, żółcień chinolinowa, aromat proszkowy naturalny cytrynowy, aromat Contramarum, sodu wodorowęglan.

Działania

Wywiera działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe udrażniające przewody nosowe.

Wskazania - Febrisan, 8 saszetek

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok.

Przeciwwskazania - Febrisan, 8 saszetek

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroba serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, fenyloketonuria, leczenie inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu.

Przeciwwskazania - Febrisan, 8 saszetek

Pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, napad astmy oskrzelowej, obniżenie ciśnienia tętniczego, nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby, niewydolność wątroby, bóle i zawroty głowy, niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.