

## FERRUM LEK 50MG/5ML 100 ML

Nasza cena: 25,71 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50MG/5ML
Opakowanie	100 ml
Postać	SYROP
Producent	SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	FERRI HYDROXYDI POLYSOMALTOSUM

## Opis produktu

## Opis

## SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 10 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą (Ferri hydroxidum polymaltosum).

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III)

polimaltozą.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

5 ml syropu zawiera:

1000 mg sacharozy

2000 mg sorbitolu, roztworu

16,25 mg etanolu

2,92 mg metylu parahydroksybenzoesanu

0,83 mg propylu parahydroksybenzoesanu

## Wskazania do stosowania:

### Produkt leczniczy Ferrum Lek jest stosowany:

- w leczeniu utajonego niedoboru żelaza,
- w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza),
- w zapobieganiu niedoborom żelaza w okresie ciąży.

## Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie i czas trwania leczenia są zależne od stopnia niedoboru żelaza.

### Utajony niedobór żelaza

Leczenie trwa około 1-2 miesięcy.

#### Niemowlęta w wieku do 1 roku

Nie należy stosować syropu Ferrum Lek ze względu na zbyt małe dawki, jakie należy podawać w tej grupie wiekowej.

#### Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

2,5 do 5 ml (1/2 do 1 łyżki miarowej) syropu Ferrum Lek na dobę (25-50 mg żelaza).

#### Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią

5 do 10 ml (1 do 2 łyżek miarowych) produktu leczniczego Ferrum Lek syrop na dobę (50-100 mg żelaza).

### Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)

Czas trwania leczenia wynosi około 3-5 miesięcy, do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny. Po tym okresie należy kontynuować terapię przez kilka tygodni w celu uzupełnienia zapasów żelaza, stosując taką dawkę, jak w leczeniu utajonego niedoboru żelaza.

#### Niemowlęta w wieku do 1 roku

Dawka początkowa syropu Ferrum Lek wynosi 2,5 ml (1/2 łyżki miarowej) na dobę (25 mg żelaza).

Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do 5 ml (1 łyżka miarowa) na dobę (50 mg żelaza).

#### Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

5 do 10 ml (od 1 do 2 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek na dobę (50-100 mg żelaza).

## **Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią**

Zwykle stosowana dawka dobową wynosi od 10 do 30 ml (2 do 6 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek (100-300 mg żelaza).

## **Kobiety w ciąży:**

### **Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)**

20 do 30 ml (4 do 6 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek, do uzyskania normalizacji stężenia hemoglobiny (200-300 mg żelaza). Następnie 10 ml (2 łyżki miarowe) na dobę co najmniej do końca ciąży, w celu uzupełnienia zapasów żelaza (100 mg żelaza).

### **Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza**

5 do 10 ml (1 do 2 łyżek miarowych) syropu Ferrum Lek na dobę (50-100 mg żelaza).

## **Sposób podawania:**

Dawkę dobową można podawać jako dawkę jednorazową lub w dawkach podzielonych.

Syrop Ferrum Lek można mieszać z sokiem owocowym lub warzywnym albo dodać do pokarmu podawanego dziecku butelką i podać w trakcie lub tuż po posiłku. Łyżka miarowa dołączona do opakowania umożliwia dokładne dawkowanie.

Niewielka zmiana barwy syropu nie wpływa na jego smak ani skuteczność.

## **Przeciwwskazania:**

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych
- Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (np. hemochromatoza, hemosyderoza).
- Zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (np. niedokrwistość, niedokrwistość spowodowana zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoblastyczna, talasemia).
- Niedokrwistość niespowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość megaloblastyczna w wyniku niedoboru witaminy B12).

## **Działania niepożądane:**

Wszystkie działania niepożądane zostały szczegółowo opisane w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować z lekarzem prowadzącym bądź też zasięgnąć porady farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.