

Fervex Malinowy, 8 saszetek



Nasza cena: 19,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Postać	Saszetki
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENIR

Opis produktu

Opis

Fervex Malinowy, 8 saszetek

Preparat w saszetkach o smaku malinowym, który stosuje się w doraźnym leczeniu objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Dawkowanie - Fervex Malinowy, 8 saszetek

2-3 razy na dobę rozpuszczając po 1 saszetce na szklankę wody. Zachowaj co najmniej 4-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie stosuj leku dłużej niż 5 dni, chyba że lekarz zalecił inaczej.

W przypadku upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej ośmiogodzinne przerwy między dawkami.

Składniki - Fervex Malinowy, 8 saszetek

Maleinian feniraminy 25mg, paracetamol 500mg, kwas ascorbowy 200mg.

Działania

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych udroźniając przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania - Fervex Malinowy, 8 saszetek

Leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła).

Przeciwwskazania - Fervex Malinowy, 8 saszetek

Nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia. Leku nie należy stosować u dzieci!

Przeciwwskazania - Fervex Malinowy, 8 saszetek

Działania neurovegetatywne: Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, omamy.

Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny.

Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna.

Uwagi

Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.