

Fibrotin, kapsułki, 30 sztuk

Nasza cena: 17,23 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	kapsułki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Fibrotin to suplement diety w postaci kapsułek.
 Produkt przeznaczony **dla osób dorosłych**.
 Zawiera **soję lub produkty pochodne**.

SKŁADNIKI

olej sojowy (całkowicie rafinowany); składnik otoczki kapsułki: żelatyna; stabilizator: monoglicerydy kwasów tłuszczowych; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); emulgator: lecytyna **sojowa**; witamina D (cholekalcyferol); barwniki (składniki otoczki kapsułki): tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawiny; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); witamina B12 (cyjanokobalamina).

Składniki	1 kapsułka	% RWS*
Witamina D	50 µg (2000 j.m.)	100,00%
Witamina B6	6 mg	429,00%
Witamina B12	10 µg	400,00%
Kwas foliowy	400 µg	200,00%

*%RWS - referencyjne wartości spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witaminy B6, B12 i foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminy B6 i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

MASA NETTO

10,2 g

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody.

OSTRZEŻENIA

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.