

# Finapil 1 mg 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 44,13 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1 MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	SUN-FARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	FINASTERIDUM

## Opis produktu

### Opis

## Finapil 1 mg, 28 tabletek powlekanych

Finapil ma postać tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną – finasteryd. Finasteryd hamuje aktywność 5 $\alpha$ -reduktazy typu II – enzymu uczestniczącego w metabolizmie testosteronu. U mężczyzn z łysieniem androgenowym finasteryd zmniejsza w organizmie stężenie produktu przemiany testosteronu, który przyczynia się do łysienia typu męskiego (androgenowego).

Lek hamuje proces miniaturyzacji mieszków włosowych na głowie, prowadząc do odwrócenia procesu łysienia. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się u mężczyzn z łagodną i umiarkowaną utratą włosów.

Finasteryd nie wykazuje działania w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet.

## Wskazanie do stosowania:

Finapil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe). Stosowany jest u mężczyzn w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie. Lek może być stosowany tylko u mężczyzn. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet i dzieci.

## Kiedy nie stosować?

- u kobiet,
- jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u mężczyzn stosujących finasteryd lub inne inhibitory 5 $\alpha$ -reduktazy typu II w leczeniu łagodnego rozrostem gruczołu krokowego albo innych chorób.

## Jak stosować lek?

- Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Zalecana dawka to 1 mg (1 tabletką) raz na dobę.
- Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków lub niezależnie od nich.
- Ważne jest, aby przyjmować lek Finapil tak długo jak zaleci lekarz, gdyż lek działa tylko po dłuższym czasie. Aby zwiększyć wzrost włosów i zapobiec ich dalszej utracie, konieczne jest stosowanie leku codziennie –co najmniej przez 3 miesiące. W celu utrzymania wyników leczenia, zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Odstawienie leku powoduje zanik wyników jego działania w ciągu 9 do 12 miesięcy

## Skład:

Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletką zawiera 1 mg finasterydu.

## Pozostałe składniki to:

### *Rdzeń tabletki:*

- laktoza jednowodna,
- celuloza mikrokryształiczna,
- skrobia żelowana kukurydziana,
- karboksymetyloskrobia sodowa typu A,
- makroglicerydów lauryniany,
- magnezu stearynian.

### *Otoczka:*

- hypromeloza 6cp,
- tytanu dwutlenek (E 171),
- makrogol 6000,
- żelaza tlenek czerwony (E 172),
- żelaza tlenek żółty(E 172)

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.