

# Finaster 5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 6,67 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	FINASTERIDUM

## Opis produktu

### Opis

## Wskazania - Finaster 5 mg 30 tabletek

Produkt stosowany w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u mężczyzn z powiększeniem gruczołu krokowego w celu:

- zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego
- poprawy przepływu moczu i regresji objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
- zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz zmniejszenia ryzyka konieczności leczenia chirurgicznego

## Dawkowanie - Finaster 5 mg 30 tabletek

Zaleca się przyjmować 1 tabl. 5 mg na dobę, niezależnie od posiłków. W celu oceny, czy osiągnięto korzystną odpowiedź na leczenie, może być niezbędna jego kontynuacja przez co najmniej 6 m-cy, mimo że zmniejszenie nasilenia objawów może być zauważalne we wczesnym okresie. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu następuje w ciągu 4 m-cy leczenia.

Dawkowanie - Finaster 5 mg 30 tabletek należy konsultować z lekarzem.

## Działanie

Finasteryd, syntetyczna pochodna 4-azasteroidowa, jest swoistym inhibitorem 5- $\alpha$  reduktazy typu II, enzymu wewnątrzkomórkowego przekształcającego testosteron do silniejszego androgeny - dihydrotestosteronu (DHT). W łagodnym rozroście gruczołu krokowego powiększenie stercza jest zależne od przekształcenia testosteronu do DHT w tkance stercza. Finasteryd bardzo skutecznie zmniejsza stężenie DHT we krwi krążącej oraz w tkankach stercza. Parametrami oceny skuteczności były: ocena objawów, maks. przepływ moczu i objętość gruczołu krokowego.

## Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

## Przeciwwskazania - Finaster 5 mg 30 tabletek

Preparat nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci. Lek jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąży - stosowanie u kobiet w czasie ciąży lub w wieku rozrodczym.

## Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są impotencja oraz zmniejszone libido. Szczegółowa lista możliwych działań niepożądanych znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.