

Fix Bratek, 2g, 30 szt.



Nasza cena: 7,27 zł

Opis słownikowy

Dawka	2G
Opakowanie	*30
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	VIOLA TRICOLOR

Opis produktu

Opis

Preparat w postaci ziół do zaparzenia, stosowany w dermatozach na tle zaburzeń przemiany materii (trądzik młodzieńczy, wyprysk, liszaj rumieniowaty). Działa moczopędnie, odtruwająco, metabolicznie.

Dawkowanie - Fix Bratek, 2g, 30 szt.

1 saszetkę ziela fiołka zalać 1/2 szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez około 5-7 minut. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: pić 3 razy dziennie po posiłkach po 1/2 szklanki naparu.

Składniki - Fix Bratek, 2g, 30 szt.

1 saszetka zawiera 2,0 g ziela fiołka trójbarwnego.

Działania

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Napar z ziela fiołka trójbarwnego stosuje się jako tradycyjny środek moczopędny.

Wskazania - Fix Bratek, 2g, 30 szt.

Tradycyjnie w schorzeniach układu moczowego, tj. w zaburzeniach oddawania moczu, w stanach zapalnych dróg moczowych (np. w zapaleniu pęcherze moczowego); w łagodnych zmianach skórnych występujących w trądziku młodzieńczym.

Przeciwwskazania - Fix Bratek, 2g, 30 szt.

Nieznane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu.

Ostrzeżenie specjalne: W przypadku nieustąpienia objawów w obrębie układu moczowego w ciągu kilku dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia się należy skonsultować się z lekarzem.

U dzieci poniżej 12 lat nie należy stosować ziela fiołka trójbarwnego bez konsultacji z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.