


## Fix Normosan 1,4g, 20 saszetek



Nasza cena: 9,40 zł

### Opis słownikowy

Dawka	1,4G
Opakowanie	*20
Postać	FIX
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

### Fix Normosan 1,4g, 20 saszetek

Napar z mieszanki stosuje się jako środek przeczyszczający w zaparciach.

### Dawkowanie - Fix Normosan 1,4g, 20 szt.

Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu leczniczego.

1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez około 15 minut. Przed udaniem się na spoczynek wypić jednorazowo od 2/3 do całości przygotowanego naparu. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić 2/3 szklanki naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można następnym razem (nie wcześniej niż po upływie doby) zwiększyć dawkę do całej szklanki naparu. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 7-10 dni. Najlepiej nie stosować częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

### Składniki - Fix Normosan 1,4g, 20 szt.

#### 1 saszetka 1,4 g zawiera:

Kora kruszyny (Frangulae cortex) - 0,280 g  
 Liść senesu (Sennae folium) - 0,140 g  
 Owoc kminku (Carvi fructus) - 0,490 g  
 Owoc bzu czarnego (Sambuci fructus) - 0,252 g  
 Liść mięty pieprzowej (Menthae pip. folium) - 0,238 g

## Działania

Przeczyszczające.

## Przeciwwskazania - Fix Normosan 1,4g, 20 szt.

Nadwrażliwość na kruszynę, senes lub którykolwiek składnik produktu. Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia). Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Bardzo rzadko u osób z nadwrażliwością mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka. W bardzo rzadkich przypadkach kora kruszyny i liście senesu mogą powodować skurczowe bóle w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem nadpobudliwego jelita. Symptomy te często są wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę. Długotrwałe stosowanie / uzależnienie może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Biegunka prowadzić może w szczególności do utraty potasu co w konsekwencji może powodować zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśniowe, w szczególności jeśli pacjent równocześnie stosuje glikozydy nasercowe, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji. Zbyt długie stosowanie preparatu może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego, może wystąpić także białkomocz i krwimocz. W czasie leczenia może dojść do zmiany zabarwienia moczu, co może być przyczyną zafałszowania wyników testów diagnostycznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

## Uwagi

Osoby przyjmujące glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, moczopędne, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego powinni skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających. Stosowanie leku powyżej 7 dni może prowadzić do uzależnienia z koniecznością zwiększania dawki, atonią okrężnicy z upośledzeniem funkcji i nasilenia się zaparć. Lek ten powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli zaparcia nie ustępują pomimo zmiany diety i stosowania łagodnych środków dietetycznych o działaniu przeczyszczającym. Leku nie należy stosować z innymi środkami przeczyszczającymi oraz lekami zapierającymi.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**