

Fix Senes, 0,99g-1,21g, 30 szt.



Nasza cena: 5,01 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,99G-1,21G
Opakowanie	*30
Producent	FLOS ZAKŁ.KONF.ZIÓŁ MOKRSKO POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CASSIA SENNA

Opis produktu

Opis

Fix Senes, zioła do zaparzania w saszetkach.

Skład

1 saszetka zawiera 0,99 - 1,21 g liści senesu co odpowiada 28,5 - 31,5 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Wskazania - Fix Senes, 0,99g-1,21g, 30 szt.

W zaparciach jako środek przeczyszczających.

Dawkowanie - Fix Senes, 0,99g-1,21g, 30 szt.

Podanie doustne w postaci naparu: 1 saszetkę produktu zalać 1 filiżanką wrzącej wody, odstawić na 10 min., przecedzić i ostudzić. Świeży i ciepły napar wypić przed snem.

Przeciwwskazania - Fix Senes, 0,99g-1,21g, 30 szt.:

Niedrożność jelit, ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Nadwrażliwość na sennozydy. Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej. Stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów. Miesiączka. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane:

Niekiedy mogą wystąpić: bóle brzucha, biegunka i zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie niedobór potasu, nudności. Przewlekłe, niezgodne z zaleceniami, stosowanie może powodować białkomocz i krwimocz oraz upośledzenie czynności motorycznej jelita grubego. Sennozydy mogą zmieniać barwę moczu.

Uwagi:Interakcje:

Następstwem długotrwałego stosowania liścia senesu może być obniżenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), a to z kolei może niepotrzebnie nasilać działanie glikozydów nasercowych oraz innych środków przeciwaritmicznych (np. chinidyny). Ponadto wiadomo, że także leki moczopędne, adrenokortykoidy oraz wyciągi z korzeni lukrecji mogą powodować nadmierne obniżenie stężenia potasu we krwi. Dlatego w celu uniknięcia nadmiernego ryzyka wystąpienia tego zjawiska nie zaleca się jednoczesnego stosowania wymienionych wyżej leków z liściem senesu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Nie stosować przy silnych bólach brzucha, wymiotach lub zawrotach głowy. Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 7-10 dni ze względu na możliwość przyzwyczajenia i nasilenia zaparc.

Przeczyszczenie następuje po około 8-12 godzinach po przyjęciu liścia senesu. Lek można zastosować tylko wówczas, gdy zmiana diety, a następnie łagodnie przeczyszczające (np. pęczniejące) nie dały pożądaných efektów.

Należy powiadomić lekarza w przypadkach krwawienia lub dalszej niemożności wypróżnienia się w czasie 2-3 dni po zażyciu środka przeczyszczającego.

Ciąża i laktacja:

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Brak danych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.