

Flavamed, syrop, 15 mg/5ml, 100 ml



Nasza cena: 16,36 zł

Opis słownikowy

Dawka	15MG/5ML
Opakowanie	100 ml
Postać	SYROP
Producent	BERLIN CHEMIE AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

Opis produktu

Opis

Lek Flavamed jest stosowany w chorobach płuc i oskrzeli, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.

Dawkowanie - Flavamed, syrop, 15 mg/5ml, 100 ml

- dzieci do ukończenia 2 rż. 2,5 ml 2 razy na dobę;
- dzieci od 3 do ukończenia 5 rż. 2,5 ml 3 razy na dobę;
- dzieci od 6 do ukończenia 11 rż. 5 ml 2-3 razy na dobę;
- dorośli i dzieci od 12 rż. 10 ml 2-3 razy na dobę przez 2-3 dni, następnie 10 ml 2 razy na dobę.

Składniki - Flavamed, syrop, 15 mg/5ml, 100 ml

5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodoru ambroksolu oraz substancje pomocnicze: sorbitol 70% niekryształizujący, kwas benzoowy, glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Działania

Lek wykazujący działanie sekretolityczne i mukokinetyczne. Ambroksol jest czynnym metabolitem bromoheksyny. Wykazuje działanie sekretolityczne i mukokinetyczne. Pobudza wydzielanie surfaktantu w pęcherzykach płucnych oraz zmniejsza jego lepkość. Zwiększa aktywność rzęsek nabłonka oddechowego i wydzielanie surowiczej wydzieliny oskrzelowej przez co ułatwia transport śluzu w drogach oddechowych.

Przeciwwskazania - Flavamed, syrop, 15 mg/5ml, 100 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Flavamed, syrop, 15 mg/5ml, 100 ml

Rzadko dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, zgaga, dyspepsja). Sporadycznie reakcje alergiczne (wysypka skórna), wyjątkowo obrzęk twarzy, duszność, wzrost ciepłoty ciała oraz reakcje typu anafilaktycznego.

Uwagi

W trakcie ciąży i karmienia piersią stosować tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.