

Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml



Nasza cena: 15,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	4 MG/5ML
Opakowanie	120ml
Postać	SYROP
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BROMHEXINUM

Opis produktu

Opis

Flegamina o smaku malinowym w postaci syropu zawiera substancję czynną chlorowoderek bromoheksyny, który jest lekiem wykrztusnym, upłynnijającym wydzielinę z dróg oddechowych.

Dawkowanie - Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml

Lek do stosowania doustnego.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

- dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 razy na dobę.
- dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Składniki - Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml

5 ml syropu zawiera:

4 mg bromoheksyny chlorowodoru,

ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Działania

Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania - Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania - Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml

Nie stosować leku Flegamina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu

Przeciwwskazania - Flegamina o smaku malinowym, syrop, 4 mg/5 ml, 120 ml

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, wysypka skórna, świąd. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne w tym ciężkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.

Uwagi

- Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

- Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.