

Flegamina Truskawkowa, syrop, 2 mg/5ml, 200 ml



Nasza cena: 24,76 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 MG/5ML
Opakowanie	200 ml
Postać	SYROP
Producent	PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BROMHEXINUM

Opis produktu

Opis

Syrop Flegamina o smaku truskawkowym zawiera bromoheksynę, która jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę dróg oddechowych.

Dawkowanie - Flegamina Truskawkowa, syrop, 2 mg/5ml, 200 ml

Zwykle lek stosuje się następująco:

Wiek Dawka syropu Flegamina o smaku truskawkowym Dawka bromoheksyny

- od 6 miesiąca życia do 12 miesiąca życia. 1/2 łyżeczki (2,5 ml) 2 do 3 razy na dobę 1 mg 2 - do 3 razy na dobę;
- od 1 do 2 lat 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę 2 mg 2 razy na dobę;
- od 2 do 5 lat 2 łyżeczki (10 ml) 2 razy na dobę 4 mg 2 razy na dobę;
- od 5 do 10 lat 2 łyżeczki (10 ml) 3 razy na dobę 4 mg 3 razy na dobę.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat 4 łyżeczki (20 ml) 3 razy na dobę 8 mg 3 razy na dobę.

Bromoheksynę należy zażywać w równych odstępach czasu (co 8 lub co 12 godzin), po posiłku.

Syrop Flegamina o smaku truskawkowym nie zawiera alkoholu.

Składniki - Flegamina Truskawkowa, syrop, 2 mg/5ml, 200 ml

(5ml syropu):

Substancja czynna: 2mg chlorowodoru bromoheksyny,

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, wodę oczyszczoną.

Działania

Dzięki swym właściwościom ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie drzewa oskrzelowego, poprawia wentylację płuc, przyspiesza ustępowanie stanu zapalnego w drogach oddechowych.

Wskazania - Flegamina Truskawkowa, syrop, 2 mg/5ml, 200 ml

Wskazaniem do stosowania leku są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania - Flegamina Truskawkowa, syrop, 2 mg/5ml, 200 ml

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne jak: reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Flegamina o smaku truskawkowym mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi

Nie należy stosować syropu Flegamina o smaku truskawkowym w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którykolwiek składnik leku.

Stosowanie syropu Flegamina o smaku truskawkowym z jedzeniem i pić:

Lek należy zażywać po posiłku.

Ciąża: Bromoheksyny nie zaleca się zażywać w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

W pozostałym okresie ciąży, lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Należy zachować ostrożność, ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub senności.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.