

Floragyn, globulki dopochwowe, 6 szt.



Nasza cena: 24,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Postać	GLOB.VAG.
Producent	So.se. Pharm S.r.l.
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat Floragyn przeznaczony jest do stosowania u kobiet w czasie: kuracji antybiotykowej, stosowania środków antykoncepcyjnych, hormonalnej terapii zastępczej, u chorych na cukrzycę, po zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie - Floragyn, globulki dopochwowe, 6 szt.

Najczęściej stosuje się jedną globulkę dziennie. Z blistra należy odciąć jedną globulkę, najlepiej nożyczkami, a następnie ją otworzyć rozchylając listki białej folii. Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy.

Składniki - Floragyn, globulki dopochwowe, 6 szt.

Floragyn globulki dopochwowe zawierają:

pałeczki kwasu mlekowego stabilizowane w wyciągu roślinnym; 6 gatunków pałeczek kwasu mlekowego (*L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, *L. bifidus* (*B. bifidum*), *L. acidophilus*, *L. thermophilus* (*S. thermophilus*), *L. casei*, *L. Plantarum*, glicerydy z ziaren pszenicy, witaminę C, kwas mlekowy, ekstrakt z alg.

W opakowaniu znajduje się 6 globulek, każda po 2 g.

Działania

Floragyn globulki dopochwowe zawierają:

- pałeczki kwasu mlekowego stabilizowane w wyciągu roślinnym; 6 gatunków pałeczek kwasu mlekowego (*L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, *L. bifidus* (*B. bifidum*), *L. acidophilus*, *L. thermophilus* (*S. thermophilus*), *L. casei*, *L. Plantarum*); aktywnie konkurują z bakteriami patogennymi, hamują ich rozwój oraz utrzymują prawidłowe pH pochwy (3,8 - 4,5),
- glicerydy z ziaren pszenicy mają aktywność wspomagającą reepitelizację błony śluzowej pochwy,
- witamina C w formie stabilizowanej chroni komórkę nabłonka,
- kwas mlekowy przyczynia się wraz z witaminą C do utrzymania kwaśnego pH środowiska pochwy,
- ekstrakt z alg działa łagodząco i efektywnie przyczynia się do zmniejszenia uczucia pieczenia oraz wspomaga utrzymanie fizjologicznego statusu pałeczek kwasu mlekowego.

Wskazania - Floragyn, globulki dopochwowe, 6 szt.

Profilaktycznie zaleca się stosowania preparatu:

- podczas uczęszczania na basen,
- korzystania z jacuzzi,
- częstych podróży.