

Flustad Max, 0,4 g + 0,01 g, 10 tabletek powlekanych

Nasza cena: 11,21 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,4G+0,01G
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	Stada Arzneimittel Ag
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Tabletki powlekane Flustad Max to lek stosowany w łagodzeniu objawów grypy czy przeziębienia oraz bólu o małym do umiarkowanego nasilenia. Lek działa dwukierunkowo. Zawarty w Flustad Max ibuprofen, działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie, natomiast fenylefryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej w nosie i uczucie zatkanego nosa. Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Flustad Max działa dwukierunkowo. Ibuprofen, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Fenylefryna powoduje zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa oraz obrzęk dróg nosowych i ogranicza ucisk, mogący wywoływać również ból głowy.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać doustnie, popijając całe tabletki wodą. Nie stosować leku bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 5 dni u osób dorosłych, a u dzieci najwyżej przez 3 dni. Zalecane dawkowanie Flustadu Max dla dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dorosłych to 1 tabletki powlekana co 8 godzin, nie częściej niż co 4 godziny. Maksymalna dawka dobową to 3 tabletki.

Wskazania:

Flustad Max stosuje się w przeziębieniu oraz grypie, również w bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, a także w gorączce.

Składniki:

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz chlorowodorek fenylefryny.

1 tabletkę powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu i 10 mg chlorowodoru fenylefryny.

Substancje pomocnicze: rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypermeloza 6 mPa. s, sodu sterylofumarany; otoczka: opadry white 200F280000 (skład: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer 1:1 (Typ A), sodu dwuwęglan).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.